

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА, 12 СЕМЕСТР

Код, направление подготовки	31.05.01 Лечебное дело
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Кардиологии
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОК-1	<i>Укажите один правильный ответ</i> 1. Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода исследования - это:	А. визуализация органов и тканей на экране прибора; Б. взаимодействие ультразвука с тканями тела человека; В. прием отраженных сигналов; Г. распространение ультразвуковых волн; Д. серошкальное представление изображения на экране прибора.	низкий	2,0
ОК-1 ОПК-9	<i>Укажите один правильный ответ</i> 2. Акустической переменной является:	А. частота; Б. давление; В. скорость; Г. период; Д. длина волны.	низкий	2,0
ОПК-9 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 3. Эндоскопическим ориентиром для проведения эндоскопа из полости рта в полость глотки служит?	А. глоточная миндалина Б. задняя стенка глотки В. небные дужки Г. корень языка Д. язычок мягкого неба	низкий	2,0
ОК-1 ОПК-9	<i>Укажите один правильный ответ</i> 4. Длина волны в мягких тканях с увеличением частоты:	А. уменьшается; Б. остается неизменной; В. увеличивается; Г. множится;	низкий	2,0
ПК-6	<i>Укажите один правильный</i>	А. одно	низкий	2,0

ПК-22	<i>ответ</i> 5. В пищеводе при эзофагоскопии определяется физиологических сужений	Б. два В. три Г. четыре Д. пять		
ПК-6 ПК-22	<i>Укажите один правильный ответ</i> 6. Первое физиологическое сужение пищевода обусловлено	А. давлением щитовидной железы Б. тонусом верхнего пищеводного сфинктера В. уклонением пищевода от средней линии Г. давлением окружающих мышц Д. давлением прилежащих сосудов	средний	5,0
ПК-6 ПК-22	<i>Укажите один правильный ответ:</i> 7. Какой из перечисленных факторов является относительным противопоказанием к стентированию коронарных артерии?	А. возраст больного более 60 лет. Б. аневризма левого желудочка В. Нет никаких противопоказаний к стентированию коронарных артерий. Г. Трепетание предсердий	средний	5,0
ПК-6 ПК-22	<i>Укажите один правильный ответ</i> 8. Длительность анализа результатов суточного мониторирования экг в рамках расчетной нормы времени проведения (время мониторирования-20-24 часа) составляет	А. 30 мин Б. 40 мин В. 60 мин Г. 90 мин Д. 120 мин	средний	5,0
ПК-22	<i>Укажите один правильный ответ</i> 9. При каком поражении коронарных артерии не желательно стентирование пораженных артерий?	А. Стентирование возможно при любых видах поражения коронарных артерии. Б. При поражении ствола ЛКА и малом диаметре (менее 2,0мм) пораженной артерии. В. При полной окклюзии правой коронарной артерии. Г. При дискретном стенозе ПКА	средний	5,0
ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 10. Какую информацию можно получить при выполнении вентрикулографии?	а) наличие зон акинезии, гипокинезии б) определение дискинезии, признаков аневризмы левого желудочка в) информацию о сократительной способности миокарда ЛЖ	средний	5,0

		<p>г)определения типа ритма сердца</p> <p>д) определение размеров сердца</p> <p>Ответ:</p> <p>А. а, б ,г</p> <p>Б. б, г, д</p> <p>В. в, г, б</p> <p>Г. д, а, б.</p> <p>Д. а, б, в</p>		
ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>11. Происхождения названия "стент"?</p>	<p>А. нет правильного ответа.</p> <p>Б. Стент - аббревиатура от англ. S.T.E.N.T. - обозначающий устранение стеноза в сосуде.</p> <p>В. По фамилии англ. Стomatолога Ч. Стента</p> <p>Г. стент - название металла, из которого он изготовлен</p>	средний	5,0
ПК-6 ПК-22	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>12. Компьютерная томография предпочтительна при изучении:</p>	<p>А. легких</p> <p>Б. легких и диафрагмальной плевры</p> <p>В. лимфатических узлов корней легких</p> <p>Г. пищевода</p>	средний	5,0
ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>13. Важность системы Пуркинье состоит в том, что она</p>	<p>А. увеличивает проведение импульсов через сердечную мышцу</p> <p>Б. предотвращает преждевременные сокращения желудочков</p> <p>В. позволяет желудочкам сокращаться практически одновременно</p> <p>Г. задерживает систолу сердца до момента наполнения желудочков</p> <p>Д. уменьшает скорость проведения импульсов через сердечную мышцу</p>	средний	5,0
ПК-6 ПК-22	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>14. Рентгенологическими признаками язвенной болезни двенадцатиперстной кишки являются:</p>	<p>а) наличие "ниши"</p> <p>б) нарушение эвакуации содержимого</p> <p>в) отключенный желчный пузырь</p> <p>г) деформация луковицы двенадцатиперстной кишки</p> <p>Ответ:</p> <p>А. а, б, в</p> <p>Б. а, б, г</p> <p>В. г, б, в</p> <p>Г. а, б, в, г</p>	средний	5,0
ПК-6	<p><i>Укажите один правильный</i></p>	<p>А. 1-2мм</p>	средний	5,0

ПК-22	<i>ответ</i> 15. Толщина стенки пищевода у взрослого человека в среднем составляет	Б. 3-4мм В. 5-6мм Г. 6-8мм Д. 8-10		
ПК-6 ПК-22	<i>Укажите все правильные ответы</i> 16. Характерные КТ-признаки эхинококка паренхиматозных органов	А. овоидной формы, больших размеров, гомогенное Б. округлое, с плотной капсулой, гомогенное В. неправильной формы, неоднородной структуры за счет солидных включений Г. округлое, с тонкой капсулой, множеством дочерних кист	высокий	8,0
ПК-6 ПК-22	<i>Укажите все правильные ответы</i> 17. Патогномичный КТ-признак расслаивающейся аневризмы аорты (при нативном исследовании)	А. очаг кальциноза в просвете аорты Б. утолщение, дезорганизованность стенки аорты В. неоднородная плотность просвета аорты Г. резкое увеличение диаметра аорты	высокий	8,0
ПК-6 ПК-22	<i>Укажите все правильные ответы</i> 18. Абсолютным противопоказанием для проведения коронарографии не является	А. непереносимость контрастного вещества Б. высокий класс стенокардии В. состояние после ОНМК Г. вирусный гепатит С в анамнезе	высокий	8,0
ПК-6 ПК-22	<i>Укажите все правильные ответы</i> 19. Низшие центры парасимпатической нервной системы расположены	А. в среднем мозге Б. продолговатом мозге В. крестцовом отделе Г. боковых рогах грудного и поясничного отделов спинного мозга	высокий	8,0
ПК-6 ПК-22	<i>Укажите все правильные ответы</i> 20. Основным фактором, определяющим коронарный кровоток, не является	А. систолическое давление Б. диастолическое давление В. пульсовое давление Г. среднее давление в аорте Д. частота пульса Е. ритм сердца	высокий	8,0