

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

**НЕОНАТОЛОГИЯ, 11 СЕМЕСТР**

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Акушерства, гинекологии и перинатологии
Выпускающая кафедра	детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> При возникновении в роддоме группового инфекционного заболевания новорожденных следует:	А. перевести в наблюдательное отделение и назначить лечение Б. оставить на месте, назначив лечение В. немедленно перевести в соответствующий стационар Г. все ответы правильные Д. вызвать инфекциониста	низкий	2,0
ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> На каком этапе внутриутробного развития максимален риск грубого повреждения плода:	А. бластогенез Б. эмбриогенез В. ранний фетальный период Г. поздний фетальный период	низкий	2,0
ПК-6 ПК-8	<i>Укажите один правильный ответ</i> Первый “перекрест” в лейкоцитарной формуле крови у недоношенных новорожденных происходит:	А. на 4-й день Б. на 5-й день В. на 6-й день Г. после 7-10-го дня	низкий	2,0
ПК-6 ПК-8	<i>Укажите один правильный ответ</i> Перинатальную смертность составляют:	А. внутриутробная гибель плодов при сроке беременности 28 недель и более, гибель плодов в процессе родов, гибель	низкий	2,0

		<p>новорожденных до 28 дней жизни</p> <p>Б. гибель плодов в процессе родов, гибель новорожденных до 7-х суток, гибель новорожденных после 7-х суток внеутробной жизни</p> <p>В. внутриутробная гибель плодов при сроке беременности 22 недель и более, гибель плодов в процессе родов, гибель новорожденных до 7-х суток внеутробной жизни</p>		
ПК-6 ПК-8	<p>Укажите один правильный ответ</p> <p>Степень дыхательной недостаточности оценивают по следующим признакам:</p>	<p>А. частоте дыхания</p> <p>Б. наличию цианоза</p> <p>В. участию в дыхании вспомогательной мускулатуры и втяжению уступчивых мест грудной клетки</p> <p>Г. всем перечисленным признакам</p>	низкий	2,0
ПК-6	<p>Укажите один правильный ответ</p> <p>Время появления физиологической желтухи:</p>	<p>А. 1-е сутки</p> <p>Б. начало 2-х суток</p> <p>В. конец 2-х суток – 3-и сутки</p> <p>Г. после 5-х суток</p>	средний	5,0
ПК-8	<p>Укажите несколько правильных ответов</p> <p>Желтуха в период новорожденности является симптомом:</p>	<p>А. гемолитической болезни</p> <p>Б. микседемы</p> <p>В. пилороспазма</p> <p>Г. адреногенитального синдрома</p> <p>Д. внутриутробных инфекций</p>	средний	5,0
ПК-6 ПК-8	<p>Укажите один правильный ответ</p> <p>Какой уровень гемоглобина считается нормальным для недоношенного ребенка в возрасте 3 недель?</p>	<p>А. не ниже 120 г/л</p> <p>Б. не ниже 130 г/л</p> <p>В. не ниже 150 г/л</p> <p>Г. не ниже 180 г/л</p> <p>Д. не ниже 200 г/л</p>	средний	5,0
ПК-6	<p>Укажите один правильный ответ</p> <p>Основные пути передачи внутрибольничной инфекции:</p>	<p>А. через руки персонала</p> <p>Б. через продукты питания</p> <p>В. через белье</p> <p>Г. через предметы ухода</p> <p>Д. через медицинский инструментарий</p>	средний	5,0
ПК-6	<p>Укажите один правильный ответ</p>	<p>А. в коже</p>	средний	5,0

	При флегмоне новорожденных первичный воспалительный процесс локализуется:	Б. в лимфатических сосудах В. в подкожной клетчатке		
ПК-6 ПК-8	<i>Укажите один правильный ответ</i> При флегмоне новорожденных чаще отмечается:	А. нормальная температура Б. субфебрильная температура В. высокая, 39-40 °С, в первые дни заболевания и резкое ее снижение после некроза клетчатки	средний	5,0
ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> Основное отличие поражения ЦНС при наследственных нарушениях обмена от поражения ЦНС гипоксического генеза:	А. симптомы поражения с возрастом уменьшаются Б. симптомы поражения с возрастом нарастают В. симптомы поражения носят неспецифический характер Г. симптомы поражения ярко выражены с рождения	средний	5,0
ПК-6 ПК-8	<i>Укажите один правильный ответ</i> Возбудителем флегмоны новорожденного является:	А. сапрофитная флора Б. грамотрицательная флора В. простейшие Г. стафилококк	средний	5,0
ПК-8	<i>Укажите один правильный ответ</i> Путем передачи ВИЧ-инфекции не является:	А. воздушно-капельный Б. половой В. трансплацентарный Г. гемотрансузионный	средний	5,0
ПК-6	1. <i>Укажите один правильный ответ</i> 2. Какая причина анемий при рождении встречается чаще других:	А. кровопотеря или гемолиз Б. наследственный микросфероцитоз В. дефицит эритроцитарных ферментов Г. наследственная гипопластическая анемия	средний	5,0
ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> Уровень прямого билирубина преобладает над содержанием непрямого билирубина:	А. при гемолитической анемии Б. болезни Минковского-Шаффера В. атрезии желчевыводящих путей	высокий	8,0
ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> В неонатологии для усиления противомикробного эффекта стартовой терапии ампициллин применяют в сочетании:	А. с эритромицином Б. с гентамицином В. с тетрациклином Г. с сульфаниламидами	высокий	8,0

ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>Новорожденным детям от матерей – носительниц HBs-антигена с профилактической целью показано введение специфического иммуноглобулина в следующие сроки:</p>	<p>А. в первые часы жизни</p> <p>Б. на 2-3-и сутки жизни</p> <p>В. при выписке из родильного дома</p> <p>Г. в возрасте 1 месяца жизни</p>	высокий	8,0
ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>Какие рентгенологические признаки являются абсолютными при пневмонии у новорожденного:</p>	<p>А. подчеркнута междолевая плевра</p> <p>Б. вздутие легких</p> <p>В. отсутствие четкого контура средостения или диафрагмы</p> <p>Г. инфильтративные изменения</p> <p>Д. гиповентиляция</p>	высокий	8,0
ПК-6	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>Какая внутриутробная инфекция часто вызывает поражение глаз и требует обязательной консультации окулиста:</p>	<p>А. краснуха</p> <p>Б. токсоплазмоз</p> <p>В. цитомегалия</p> <p>Г. листериоз</p> <p>Д. герпес-инфекция</p> <p>Е. все перечисленное</p>	высокий	8,0