

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 07.06.2024 08:41:22  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Форма оценочного материала для диагностического тестирования  
 Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:  
 Общая хирургия

Код, направление подготовки	31.05.01
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Хирургических болезней
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите один правильный ответ</b> 1. Хирургического лечения может потребовать паразитарное заболевание, вызванное:	1. аскаридами; 2. лямблиями; 3. актиномицетами; 4. цистицерком; 5. острицами.	Низкий уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите один правильный ответ</b> 2. Рак (карцинома) – это злокачественная опухоль, развивающаяся из:	1. соединительной ткани; 2. железистой ткани; 3. эпителия.	Низкий Уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите один правильный ответ</b> 3. Клинико-морфологические признаки злокачественной опухоли все, кроме:	1. наличия капсулы; 2. инфильтративного роста; 3. полиморфизма строения;	Низкий уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите один правильный ответ</b> 4. Укажите симптом, не наблюдающийся при травматическом вывихе плеча:	1. боль в плечевом суставе; 2. резкое ограничение движений в суставе; 3. деформация и припухлость сустава; 4. крепитация при пальпации головки плеча; 5. пружинящая фиксация плеча при попытке движений в суставе.	Низкий уровень

ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите один правильный ответ</b> 5. Для глубоких ожогов характерно фазовое течение раневого процесса. Исключите неверно указанную фразу:	1. омертвление ткани в момент ожога ; 2. серозное асептическое воспаление; 3.реактивный травматический отек; 4.гнойное демаркационное воспаление; 5.регенерация.	Низкий уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 6. Из чего получают фибриноген?	1. Из плазмы крови. 2. Из эритроцитов. 3. Из тромбоцитов. 4. Из костного мозга.	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 7. Отечность, цианоз, наличие пузырей со светлой жидкостью характерно для отморожения:	1. первой степени; 2. второй степени; 3. третьей степени; 4. четвертой степени.	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 8. Что не относится к лабораторным признакам массивной кровопотери:	1. Уменьшение количества гемоглобина. 2.Повышение гематокрита. 3.Снижение гематокрита. 4.Уменьшение количества эритроцитов.	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 9. Отморожение – это повреждение тканей при действии:	1. высоких температур; 2. умеренных температур; 3. низких температур.	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 10. Для свежей раны характерно все, кроме:	1. боли; 2. кровотечения; 3. подергивания мышц; 4. зияния.	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 11. При вторичном заживлении ран различают все основные этапы, кроме:	1. рассасывания погибших клеток и сгустков крови; 2. первичной склейки (фибрином); 3. развития грануляций; 4. рубцевания и эпителизации.	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b>	1. иссечение краев и дна раны; 2. вскрытие карманов и затеков;	Средний уровень

	12. Под первичной хирургической обработкой раны следует понимать:	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 удаление гнойного отделяемого;</li> <li>4 иссечение краев, стенок и дна раны;</li> <li>5 промывание раны антисептиком; гемостаз.</li> </ul>	
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<p><b>Укажите все правильные ответы</b></p> <p>13. Что не относится к общим симптомам острого массивного кровотечения:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Снижение артериального давления.</li> <li>2.Слабость, головокружение.</li> <li>3.Истечение крови из раны.</li> <li>4.Тахикардия.</li> <li>5.Бледность и влажность кожных покровов.</li> </ul>	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<p><b>Укажите все правильные ответы</b></p> <p>14. Чем отличается поздняя первичная хирургическая обработка от вторичной хирургической обработки?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. техникой операции;</li> <li>2. сроками операции; числом предыдущих перевязок;</li> <li>3. отсутствием первичной хирургической обработки;</li> <li>4. применением дренирования или отказом от него.</li> </ul>	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<p><b>Укажите все правильные ответы</b></p> <p>15. Оптимальные условия для развития газовой гангрены возникают при:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. закрытых переломах;</li> <li>2. механических повреждениях кожных покровов;</li> <li>3. ожогах II-IV степени;</li> <li>4. отморожениях II-IV степени;</li> <li>5. укусах насекомых.</li> </ul>	Средний уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<p><b>Укажите все правильные ответы</b></p> <p>16. Для предупреждения регургитации во время вводного наркоза необходимо:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. ввести атропин;</li> <li>2. опустить головной конец;</li> <li>3. миорелаксанты вводить медленно;</li> <li>4. проводить принудительную вентиляцию мешком перед интубацией;</li> <li>5. применить прием Селлика.</li> </ul>	Высокий уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<p><b>Укажите все правильные ответы</b></p> <p>17. Какая операция не выполняется в ранние</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. вскрытие флегмоны;</li> <li>2. рассечение надкостницы;</li> <li>3. трепанация костно-мозговой полости;</li> </ul>	Высокий уровень

	сроки при остром остеомиелите?	4. секвестрэктомия; 5. костная пластика.	
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 18. Преимуществом эндотрахеального метода анестезии является:	1. создание оптимальных условий для работы хирурга; 2. обеспечение проходимости дыхательных путей; 3. предупреждение развития бронхоспазма; 4. предупреждение остановки сердца; 5. обеспечение хорошей аналгезии.	Высокий уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 19. К возбудителям хирургического сепсиса не относятся:	1. кишечная палочка; 2. гемолитический стрептококк; 3. золотистый стафилококк; 4. протей; 5. синегнойная палочка.	Высокий уровень
ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-8	<b>Укажите все правильные ответы</b> 20. Преимущество внутривенной общей анестезии состоит в том, что:	1. не требуется сложной аппаратуры; 2. отсутствует стадия возбуждения; 3. быстрое введение в наркоз; 4. взрывобезопасность; 5. все ответы правильные.	Высокий уровень